



Az **elhanyagolt** fog megbetegedése gyakran ahhoz vezet, hogy kénytelenek vagyunk **eltávolítani** a fogat. Az elhalt fog körüli gyulladás ráterjedhet a [gyökércsúcsra](#), a környező csontokra. Ennek következtében a fog körüli terület megduzzad, a fogak fellazulnak, mozgathatóvá válnak, érintésre fájdalmasan reagálnak. A **gyulladás** következménye lehet láz és hidegrázás is. A felső fogak körüli gyulladásból arcüreggyulladás is kialakulhat. A fog eltávolítása szükségessé válhat akkor is, ha az krónikus gyulladást tart fenn, ezek az úgynevezett göccs fogak. Néhány esetben ép fogakat is el kell távolítani, pl. fogszabályozás céljából a kisőrlőt, vagy beékelt bölcsességfogot, szemfogot, illetve a fogpótlás tervezésekor akadályt jelentő rosszul kinőtt fogat.

## Egyszerű fogeltávolítás

**Helyi érzéstelenítésben** végezzük, 2% -os Lidocain oldattal történő injekció adásával. Miután meggyőződünk a műtéti terület érzéketlenségéről, ínyletolóval leválasztjuk a fogínyt a fogról, majd a fogó felhelyezésével eltávolítjuk a fogat. Ha gyulladt a fog, a sebüregben levő gyulladással szövetet is el kell távolítani. A sebszéleket összenyomjuk, a beavatkozás után pedig 15 percig gézlapra haraptatjuk a páciens. A beavatkozás teljesen fájdalommentes, mint minden egyéb a [Királyudvar Fogorvosi Rendelőnkben](#).